

2013 年硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：821 科目名称：电磁场与电磁波 满分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸必须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、简述电磁场中的高斯定理，设有一个很薄的无限大导电带电面，电荷面密度为 ρ_s 。试计算垂直于平面的z轴上 $z=z_0$ 处的电场强度E。（15分）

二、假设同轴线内、外导体半径分别为a和b，不计外导体厚度，内外导体间填充的介质是同轴分层的，在 $a < \rho < c$ 处磁介质参数为 $\mu_{r1} = 4$ ，在 $c < \rho < b$ 处磁介质参数为 $\mu_{r2} = 2$ ，计算同轴线单位长度的电感。（15分）

三、在线性、时不变、均匀各向同性媒质中，写出麦克斯韦方程组的积分形式，并解释各方程的物理意义。（15分）

四、由麦克斯韦方程组推导均匀、线性、时不变、各向同性媒质中时谐场有源情况下磁场强度的波动方程。（15分）

五、有一均匀平面波的电场强度矢量为 $E = (e_x + 2je_y)e^{-jkz}$ ，证明可将其分解为两个旋向相反的圆极化波。（15分）

六、判断下列波的极化情况（如果是圆极化或椭圆极化请说明是左旋还是右旋）
(共15分，每小题5分)

1. $E = (je_x + 2e_y)e^{jkz}$

2. $E(z,t) = e_x 10^{-4} \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{\pi}{3} z + \frac{\pi}{2}) + e_y 10^{-4} \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{\pi}{3} z)$

3. $E = (e_x + 2e_y + e_z)10 \cos(10^5 \pi t + 3x - y - z)$

七、在空气中均匀平面波的波长为12cm，当该平面波进入某均匀无耗媒质中传播时，其波长变为8cm，已知在媒质中的电场和磁场振幅分别为50V/m和0.1A/m。求该平面波的频率和媒质的参数 ϵ_r ， μ_r 。（15分）

八、已知一个圆极化波的电场强度矢量为： $E = (e_x + je_y)E_0 e^{-jkz}$ 。证明：圆极化波的瞬时坡印廷矢量是与时间和距离都无关的常数。（15分）

九、已知在空气(ϵ_0, μ_0)中 $E = e_x 0.1 \sin(6\pi \times 10^9 t - \beta z)$ ，求 β 和H。（15分）

十、有一x方向极化的均匀平面波（真空中的波长为10m）沿z方向传播，自介质($\epsilon = 4\epsilon_0$ ， $\mu = \mu_0$ ， $\sigma = 0$)中垂直入射到 $z=0$ 处的理想导体平面上，已知入射波的磁场强度在 $t=0$ ， $z=0$ 时达到其振幅值 $H_m = 0.01 A/m$ 。求：(1)入射波的频率，介质中的相位常数和波长；(2)入射波电场强度的瞬时表达式；(3)在介质中合成波磁场强度波腹点位置和波腹值；(4)导体表面感应电流密度。（15分）

注： $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} F/m$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m$

$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$

