

2023 年全国硕士研究生入学统一考试

临床医学综合能力（西医）真题

1. 下列选项属于前馈的是

- A 动脉血压在压力感受器作用下维持稳定
- B 脚踩铁钉引起肢体回撤动作
- C 长期大剂量使用可的松引起肾上腺皮质萎缩
- D 百米赛跑枪声未响运动员心率增加

2 单纯扩散的是

- A 葡萄糖
- B 肽类激素
- C 氨基酸
- D 甘油

3 横纹肌收缩中，与横桥结合的蛋白是

- A 肌钙蛋白
- B 原肌球蛋白
- C 肌动蛋白
- D 钙调蛋白

4. RH 阳性的抗原

- A 抗原
- B 抗原
- C H 抗原
- D 抗原

5 在一个心动周期里，第一心音出现在

- A 等容收缩期
- B 等容舒张期
- C 快速射血期
- D 减慢射血期

6. 心室肌细胞静息电位和动作电位平台期都发挥作用的离子流是

- A I_K
- B I_{K1}
- C I_{Ca-L}
- D I_{Ca-t}

7. 肺泡表面活性物质是哪个细胞分泌的

- A 肺泡上皮 I 型细胞



- B 肺泡上皮 I 型细胞
C 肺间质细胞
D 肥大细胞
- 8.胃和十二指肠黏膜含有抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌的物质是
A HCO_3^-
B 前列腺素
C 缩胆囊素
D 组胺
- 9.一般情况下,人体 24 小时内的不感蒸发量约为
A 200ml
B 600ml
C 1000ml
D 1500ml
- 10.肾脏在对尿液的浓缩和稀释、调节体内水平衡中,起关键作用的活性物质是
A 肾素
B 醛固酮
C 血管升压素
D 血管紧张素
- 11.肾小管通过泌酸,调节体内酸碱平衡中,其中起重要作用的酶
A 环加氧酶
B 碳酸酐酶
C 磷酸二酯酶
D 钠钾 ATP 酶
- 12.下列关于筒箭毒碱松弛肌肉的机制,正确的是
A 抑制突触前膜 Ach 囊泡的动员
B 抑制突触前膜 Ach 囊泡的着位
C 增强乙酰胆碱酯酶的活性
D 抑制神经-肌接头终板膜上的受体
- 13.下列节后神经纤维中,属于交感肾上腺素能神经纤维的是
A 支配全身小汗腺的神经纤维
B 引发骨骼肌血管舒张的神经纤维
C 引起大量稀薄唾液分泌的神经纤维
D 寒冷时引起皮肤血管收缩的神经纤维
- 14.被视物体由远及近,不会出现的眼调节活动有
A 双眼汇聚
B 晶状体变凸
C 瞳孔调节活动

D 瞳孔对光反射

15.甲状腺功能亢进症患者，不会出现的表现有

- A 低血糖
- B 心力衰竭
- C 骨质疏松
- D 精神亢进

16.睾丸分泌的抑制素生理作用

- A 抑制 FSH
- B 抑制睾酮
- C 抑制 LH
- D 抑制 GNRH 分泌

17.蛋白质结构域的结构层次是

- A 一级结构
- B α 螺旋
- C β 折叠
- D 三级结构

18.关于酶促反应调节叙述，错误的是

- A 酶蛋白可通过别构变化进行调节
- B 酶蛋白可通过共价修饰进行调节
- C 酶原可通过激活过程形成有活性的酶
- D 酶的含量调节属于快速调节

19.NAD⁺和 NADP⁺所含有的维生素是

- A 维生素 B1
- B 维生素 B2
- C 维生素 PP
- D 维生素 K

20.催化磷酸烯醇式丙酮酸转化为丙酮酸并生成 ATP 的是

- A 醛缩酶
- B 磷酸甘油酸激酶
- C 丙酮酸激酶
- D 丙酮酸脱氢酶

21.脂肪酸 β -氧化途径的限速酶是

- A 酯酰 CoA 合成酶
- B 肉碱酯酰转移酶 I
- C 酯酰 CoA 脱氢酶
- D β -酮酯酰 CoA 硫解酶

22. 下列不参与氧化磷酸化偶联的复合体

- 23.A 复合体 I
- 24.B 复合体 II
- 25.C 复合体 III
- 26.D 复合体 IV

23. 下列哪项是尿素合成的关键酶

- A 鸟氨酸氨基甲酰转移酶
- B 精氨酸代琥珀酸合成酶
- C 精氨酸代琥珀酸裂解酶
- D 精氨酸酶

24. 不直接参与合成嘌呤核苷酸的物质

- A 谷氨酰
- B 天冬氨酸
- C 丝氨酸
- D 一碳单位

25. 具有修复双链断裂 DNA 损伤的修复系统

- A 错配修复
- B 直接修复
- C 重组修复
- D 碱基切除修复

26. 下列遗传密码特点中，与移码突变密切相关的是

- A 通用性
- B 方向性
- C 连续性
- D 摆动性

27. 真核生物转录因子结构中，属于转录激活结构域的是

- A 锌指结构
- B 螺旋-环-螺旋
- C 亮氨酸拉链
- D 富含谷氨酰胺结构域

28. 目前常用于分析体内 DNA 与蛋白质相互作用的分子生物学技术是

- A 标签蛋白沉淀
- B 凝胶迁移变动分析
- C 蛋白质印迹技术
- D 酵母双杂交技术

29. 在巨噬细胞体内形成的色素是

- A 脂褐素

- B 黑色素
- C 胆红素
- D 含铁血黄素

30.容易发生机化的病变是

- A 肺脓肿
- B 脑梗死灶
- C Barret 食管
- D 宫颈管鳞状上皮化生

31.来自左心房球状血栓的类型是

- A 红色血栓
- B 白色血栓
- C 透明血栓
- D 混合血栓

32.男性，62岁。体检发现右锁骨上淋巴结肿大，无压痛。淋巴结切除送检，病理诊断：淋巴结内可见腺癌浸润，肿瘤原发部位最可能是

- A 食管
- B 胃
- C 肝
- D 肺

33.微小病变性肾小球病，光镜下表现

- A 局灶性节段性玻璃样变和硬化
- B 系膜细胞增生，系膜基质增厚
- C 新月体形成
- D 基本正常

34.下列与肝功能不全无直接关系的是

- A 蜘蛛痣
- B 脾大
- C 出血倾向
- D 黄疸

35.下列肿瘤中，不属于恶性肿瘤的是

- A 神经母细胞瘤
- B 髓母细胞瘤
- C 肾母细胞瘤
- D 骨母细胞瘤

36.胃体黏膜活检可见大量假幽门腺化生，病理诊断是

- A 慢性浅表性胃炎
- B 慢性萎缩性胃炎

- C 慢性肥厚性胃炎
- D 疣状胃炎

37.可伴低钙血症的甲状腺癌是

- A 乳头状癌
- B 滤泡状癌
- C 髓样癌
- D 未分化癌

38.累及骨旁软组织行成“冷脓肿”的疾病是

- A 骨肉瘤
- B 骨结核
- C 骨髓瘤
- D 骨髓炎

39.子宫颈息肉的病变性质是

- A 良性肿瘤
- B 癌前病变
- C 原位癌
- D 炎性病变

40.关于卵巢交界性浆液性囊腺瘤的叙述，正确的是：

- A 由两种胚层组织构成
- B 由两种不同上皮组织构成
- C 生物行为介于良性恶性之间
- D 由上皮组织和间叶组织构成

41.下列疾病中，最可能先出现意识障碍后发热的疾病有：

- A 流行性乙型脑炎
- B 中暑
- C 有机磷农药中毒
- D 中毒性痢疾

42.下列提示支气管哮喘重度急性发作的是：

- A 呼吸频率>30 次/分
- B 日间哮喘症状>4 次/周
- C 双肺散在呼气相哮鸣音
- D PEF 占预计值百分比 65%

43.女性，40 岁，低热、间断咯血 2 个月，每次 3-4 口，鲜红色，既往体检。查体：T37.8℃，双肺叩诊清音，呼吸音清，未闻及干湿啰音，肺 CT 提示双上肺多发结节，内有空洞，最有助于确诊的检查是：

- A PPD 试验可见水疱
- B 肺穿刺活检可见肉芽肿病变

- C 痰涂片抗酸染色阳性
- D 干扰素释放试验阳性

44. 不适用于肺炎支原体肺炎治疗的抗生素是:

- A 大环内酯类
- B 喹诺酮类
- C 四环素
- D β -内酰胺类

45. 男性, 72 岁, 高血压及心动过缓 25 年, 三个月来阵发心悸, 当地医院诊断心房颤动。服用华法林治疗, 一周以来出现多次黑蒙, 持续数秒可恢复。查体 p42 次/分, bp135/80mmh, 心界不大, 心律不齐, 动态心电图可见频发 RR 间期大于 2.5 秒, 在继续使用华法林的基础上, 应选择正确的治疗

- A 服用胺碘酮转复心率
- B 植入 DDD 起搏器
- C 射频消融+ β 受体阻滞剂
- D 射频消融+起搏器

46. 男, 65 岁。4 小时前胸部疼痛, 持续不缓解, 医院诊断“急性下壁、右室心肌梗死”, 即转入院。查体: 血压 82/55mmHg, 神清, 双肺 (-), 心率 54 次/分, 心律齐, 心音低钝, 四肢末梢体温正常。此时应首先采取的治疗措施是

- A 即刻静注硝酸甘油
- B 静脉快速输液
- C 静点多巴胺升压
- D 即刻植入临时起搏器

47. 可作为鉴别急性心肌炎和扩张性心肌病的检查是?

- A 胸部 X 线
- B 心肌损伤标志物
- C 血 BNP
- D 超声心动图

48. 24 小时动态血压检查诊断高血压的标准:

- A 白天 \geq 140/80 或者夜间 \geq 130/90
- B 白天 \geq 140/90 或者夜间 \geq 130/80
- C 白天 \geq 135/85 或者夜间 \geq 120/70
- D 白天 \geq 130/80 或者夜间 \geq 120/80

49. 女, 38 岁, 反复反酸烧心, 平卧位时更明显, 近一年加重, 最应选择哪种药物治疗?

- A 硫糖铝
- B 奥美拉唑
- C 法莫替丁
- D 多潘立酮

50. 下列对诊断门脉高压腹水最有价值的检查是

- A 腹水 ADA
- B 腹水 LDH
- C 腹水白细胞
- D 血清腹水清蛋白梯度

51. 女, 64 岁, 饱餐后上腹痛并恶心呕吐 4 小时, 吐后腹痛持续不缓解, 并向腰背部放射, 既往高血压病史, 下列检查对病因最有价值的是

- A 血常规
- B 心电图
- C 血清淀粉酶
- D 急诊胃镜

52. 急性肾盂肾炎最常见的感染途径

- A 上行性
- B 血行性
- C 淋巴道
- D 直接感染

53. 男性, 25 岁, 发热伴皮肤淤斑 1 周。查体: 体温 38.5°C , 贫血貌, 皮肤见数处瘀斑, 胸骨压痛 (+)。血常规: 血红蛋白 75g/l , $\text{wbc}16.2 \times 10^9$, $\text{plt}25 \times 10^9$ 。骨髓细胞学检查见原始细胞 87%, 原始细胞的 mpo 弱阳性, nse 阳性, naf 可抑制。该患者最可能的特异性表现是

- A 浅表淋巴结肿大
- B 脾大
- C 睾丸无痛性肿大
- D 牙龈增生、肿胀

54. 关于 cushing 综合症的病因诊断, 除了测血 ACTH, 以下最有价值检查项目是

- A 24 小时游离皮质醇
- B 血皮质醇节律变化
- C 大剂量地塞米松抑制试验
- D 小剂量地塞米松抑制试验

55. 以下风湿性疾病, 分类属于脊柱关节炎的是

- A 银屑病关节炎
- B 骨关节炎
- C 风湿性关节炎
- D 类风湿性关节炎

56. 女性, 26 岁。左下肢肿胀, 疼痛。既往曾多次流产。血常规: $\text{Hb}115\text{g/L}$, $\text{WBC}7 \times 10^9/\text{L}$, $\text{Plt}45 \times 10^9/\text{L}$ 。为明确诊断, 最有价值的检查为

- A 血抗核抗体
- B 血抗磷脂抗体

- C 血类风湿因子
- D 骨髓检查

57.关于腹部切口裂开的原因，错误的是

- A 营养不良
- B 手术后剧烈咳嗽
- C 应用糖皮质激素
- D 行切口减张缝合

58.胃肠道手术前正确的准备是

- A 禁食 4 小时，禁饮水 12 小时
- B 禁食 6 小时，禁饮水 2 小时
- C 禁食 12 小时，禁饮水 4 小时
- D 禁食 24 小时，禁饮水 12 小时

59.男性，24 岁。撞伤右季肋部 1 小时急诊就诊。初步诊断为失血性休克，肝破裂。在等待血型鉴定和交叉配血期间，首选的输注液体是

- A 5%葡萄糖溶液
- B 5%葡萄糖 NaCl 溶液
- C 平衡盐溶液
- D 10%葡萄糖液

60.关于前列腺增生手术指征的叙述，错误的是

- A 反复尿潴留
- B 反复泌尿系感染
- C 血清 PSA 轻度升高
- D 继发膀胱结石

61.男 23 岁，胸部钝挫伤两小时，自述呼吸困难，听诊右侧呼吸音消失，胸片提示右侧大量胸腔积液，为明确诊断最有价值

- A 胸部 CT
- B 胸部超声
- C 胸腔穿刺
- D 胸部 MRI

62.女性，40 岁，发现颈部肿物伴疼痛三天就诊。查体，左颈前可触及直径 3cm 肿物，边界清，质韧，光滑，可随吞咽移动，触痛(+)，最可能的诊断是

- A 亚急性甲状腺炎
- B 甲状舌管囊肿
- C 甲状腺腺瘤囊内出血
- D 甲状腺癌

63.关于腹股沟直疝的叙述，正确的是

- A 疝内容物经腹壁下动脉外侧突出

- B 多见于青年男性
C 压住深环站立时疝块出
D 易发生嵌顿和绞窄
64. 男性，90岁，右上腹痛5天就诊。既往有心肌梗死、脑出血病史。查体体温38度，右上腹压痛明显，腹部B超提示：胆囊10cm×5cm，壁厚0.5cm，腔内可见多发结石，直径最大1.5cm，胆总管直径0.6cm。化验血WBC：15乘以10的9次方每升，最适宜的治疗方案是？
A 急性胆囊切除术
B 急性胆囊切除加胆总管引流术
C 急诊经皮经肝胆囊穿刺引流术
D 急诊开腹胆囊造瘘术
65. 对于骨盆骨折合并尿道损伤及失血性休克患者，正确的处理顺序是？
A 骨盆骨折-尿道损伤-休克
B 尿道损伤-休克-骨盆骨折
C 休克-骨盆骨折-尿道损伤
D 休克-尿道损伤-骨盆骨折
66. 肩关节脱位的最常见类型
A 后脱位
B 上脱位
C 前脱位
D 下脱位
67. 骨筋膜室综合征最早期临床表现是
A 皮肤发黑
B 肌力减退
C 手指或足趾呈屈曲
D 持续性剧烈疼痛
68. 男性，32岁，因发热、盗汗、咳嗽伴右胸痛2周，气短不能平卧3天来诊。既往有肺结核病史。查体：T37.8℃，P96次/分，R20次/分，BP110/70mmHg。气管向左偏斜，右中下肺叩诊浊音，呼吸音消失，双肺未闻及干湿性啰音，心律齐，心音正常，肝脾肋下未及，双下肢无水肿。最可能的诊断是
A 右下肺炎
B 右侧胸膜肥厚
C 肺栓塞
D 右侧胸腔积液
69. 男性，32岁，因发热、盗汗、咳嗽伴右胸痛2周，气短不能平卧3天来诊。既往有肺结核病史。查体：T37.8℃，P96次/分，R20次/分，BP110/70mmHg。气管向左偏斜，右中下肺叩诊浊音，呼吸音消失，双肺未闻及干湿性啰音，心律

齐，心音正常，肝脾肋下未及，双下肢无水肿。为尽快缓解该患者症状，制定下一步诊治方案，应首选的检查是

- A 胸部 B 超
- B 心电图
- C 胸部 CT
- D CTPA

70. 男性，45岁，因4个月来乏力、食欲下降伴腹胀、尿少，1个月来低热，活动后气短、腹胀明显加重来诊。既往有肝炎病史。查体：T37.5℃，P98次/分，R18次/分，BP104/72mmHg。半卧位，上胸部可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺(-)，全腹有压痛及反跳痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音(+)，双下肢可凹性水肿(+)。化验：血Hb 106g/L，WBC 7.4*10⁹/L，N 0.88，PLT 70*10⁹/L，尿胆红素(+)，血ALT110U/L，AST130U/L，T-Bil98umol/L，D-Bil 65umol/L。应首先考虑的诊断是

- A 肝硬化并发自发性细菌性腹膜炎
- B 肝硬化并发门静脉血栓
- C 肝硬化并发结核性腹膜炎
- D 肝硬化并发肝癌

71. 男性，45岁，因4个月来乏力、食欲下降伴腹胀、尿少，1个月来低热，活动后气短、腹胀明显加重来诊。既往有肝炎病史。查体：T37.5℃，P98次/分，R18次/分，BP104/72mmHg。半卧位，上胸部可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺(-)，全腹有压痛及反跳痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音(+)，双下肢可凹性水肿(+)。化验：血Hb 106g/L，WBC 7.4*10⁹/L，N 0.88，PLT 70*10⁹/L，尿胆红素(+)，血ALT110U/L，AST130U/L，T-Bil98umol/L，D-Bil 65umol/L。对该患者进行腹腔穿刺做腹水检查的最主要适应证是

- A T37.5℃，巩膜黄染，肝功能异常
- B T 37.5℃，全腹有压痛及反跳痛，移动性浊音(+)
- C 巩膜黄染，肝脾触诊不满意
- D 肝疾病史，可见蜘蛛痣，巩膜黄染

72. 男性，45岁，因4个月来乏力、食欲下降伴腹胀、尿少，1个月来低热，活动后气短、腹胀明显加重来诊。既往有肝炎病史。查体：T37.5℃，P98次/分，R18次/分，BP104/72mmHg。半卧位，上胸部可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺(-)，全腹有压痛及反跳痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音(+)，双下肢可凹性水肿(+)。化验：血Hb 106g/L，WBC 7.4*10⁹/L，N 0.88，PLT 70*10⁹/L，尿胆红素(+)，血ALT110U/L，AST 130U/L，T-Bil 98umol/L，D-Bil 65umol/L。下列支持该患者诊断的腹水检查结果是

- A 外观透明浅黄，比重 1.012，蛋白定量 15g/L 175:59
- B 外观混浊，白细胞数 600*10⁹/L，单核 98%，蛋白定量 35g/L
- C 外观混浊，白细胞数 900*10⁹/L，多核 60%，蛋白定量 45g/L
- D 外观混浊，比重 1.015，蛋白定量 25g/L，LDH158U/L

73. 男性, 61 岁, 反复咳嗽、咳痰 10 余年, 活动后气短 1 年, 1 周前受凉后出现气短加重, 咳黄痰, 伴发热, 体温最高 39°C , 夜间可平卧。既往吸烟 30 年。查体: $T 38.2^{\circ}\text{C}$, $P 96$ 次/分, $R 23$ 次/分, $BP 150/80\text{mmHg}$, 神态清楚, 球结膜水肿, 口唇发绀, 桶状胸, 听诊双肺呼吸音低, 可闻及散在湿啰音。未吸氧时动脉血气分析示 $PH 7.31, PaCO_2 78\text{mmHg}, PaO_2 52\text{mmHg}$ 。该患者出现 $PaCO_2$ 升高的原因不包括:

- A 肺泡通气量下降
- B 无效腔通气增加
- C 内源性 PEEP
- D 弥散功能障碍

74. 男性, 61 岁, 反复咳嗽、咳痰 10 余年, 活动后气短 1 年, 1 周前受凉后出现气短加重, 咳黄痰, 伴发热, 体温最高 39°C , 夜间可平卧。既往吸烟 30 年。查体: $T 38.2^{\circ}\text{C}$, $P 96$ 次/分, $R 23$ 次/分, $BP 150/80\text{mmHg}$, 神态清楚, 球结膜水肿, 口唇发绀, 桶状胸, 听诊双肺呼吸音低, 可闻及散在湿啰音。未吸氧时动脉血气分析示 $PH 7.31, PaCO_2 78\text{mmHg}, PaO_2 52\text{mmHg}$ 。引起该患者病情加重最不可能的病原体是

- A 流感嗜血杆菌
- B 肺炎链球菌
- C 肺炎支原体
- D 铜绿假单胞菌

75. 男性, 61 岁, 反复咳嗽、咳痰 10 余年, 活动后气短 1 年, 1 周前受凉后出现气短加重, 咳黄痰, 伴发热, 体温最高 39°C , 夜间可平卧。既往吸烟 30 年。查体: $T 38.2^{\circ}\text{C}$, $P 96$ 次/分, $R 23$ 次/分, $BP 150/80\text{mmHg}$, 神态清楚, 球结膜水肿, 口唇发绀, 桶状胸, 听诊双肺呼吸音低, 可闻及散在湿啰音。未吸氧时动脉血气分析示 $PH 7.31, PaCO_2 78\text{mmHg}, PaO_2 52\text{mmHg}$ 。该患者经治疗后出现嗜睡, 意识模糊。复查动脉血气分析(吸氧 $2\text{L}/\text{min}$): $PH 7.24, PaCO_2 85\text{mmHg}, PaO_2 62\text{mmHg}$, 首选的治疗措施是

- A 气管插管有创机械通气
- B 无创机械通气
- C 经鼻高流量氧疗
- D 上调吸氧流量至 $5\text{L}/\text{min}$

76. 女性, 36 岁。发热 2 周, 体温波动在 $37.5-38.5^{\circ}\text{C}$, 伴乏力、出汗、食欲不振。既往有甲亢、二尖瓣脱垂史。查体: $T 38.1^{\circ}\text{C}$, $P 106$ 次/分, $BP 110/75\text{mmHg}$, $BMI 18\text{kg}/\text{m}^2$, 左眼睑结膜可见淤点, 咽充血, 甲状腺无肿大, 心界稍大, 心律齐, 心尖部内侧可闻及 $4/6$ 级收缩期吹风样杂音, 肝未及, 脾肋下 1cm 。化验: 血 $Hb 98\text{g}/\text{L}$, $WBC 11.2 \times 10^9/\text{L}$, $ESR 85\text{mm}/\text{h}$, 尿常规: 蛋白(±), 沉渣镜检 $RBC 10-15$ 个/HP。该患者最可能的诊断是

- A 甲状腺功能亢进症
- B 亚急性感染性心内膜
- C 风湿热活动期
- D 急性肾小球肾炎

77.女性, 36 岁。发热 2 周, 体温波动在 37.5-38.5℃, 伴乏力、出汗、食欲不振。既往有甲亢、二尖瓣脱垂史。查体: T38.1℃, P1061 次/分, BP110/75mmHg, BMI18kg/m², 左眼睑结膜可见淤点, 咽充血, 甲状腺无肿大, 心界稍大, 心律齐, 心尖部内侧可闻及 4/6 级收缩期吹风样杂音, 肝未及, 脾肋下 1cm。化验: 血 Hb98g/L, WBC 11.2*10⁹/L, ESR 85mm/h, 尿常规: 蛋白(±), 沉渣镜检 RBC10-15 个/HP。该患者还有可能出现的体征是

- A Osler 结节
- B 环形红斑
- C Janeway 损害
- D Graefe 征

78.女性, 36 岁。发热 2 周, 体温波动在 37.5-38.5℃, 伴乏力、出汗、食欲不振。既往有甲亢、二尖瓣脱垂史。查体: T38.1℃, P1061 次/分, BP110/75mmHg, BMI18kg/m², 左眼睑结膜可见淤点, 咽充血, 甲状腺无肿大, 心界稍大, 心律齐, 心尖部内侧可闻及 4/6 级收缩期吹风样杂音, 肝未及, 脾肋下 1cm。化验: 血 Hb98g/L, WBC 11.2*10⁹/L, ESR 85mm/h, 尿常规: 蛋白(±), 沉渣镜检 RBC10-15 个/HP。下列检查中, 最有可能为明确诊断提供重要依据的是

- A 血 C 反应蛋白
- B 胸部 CT 检查
- C 甲状腺 B 超检查
- D 超声心动图检查

79.男性, 31 岁, 3 个月来低热, 右下腹痛, 加重半个月, 常有便秘, 有时腹泻伴糊样便。既往有肺结核病史。查体: T37.6℃, 浅表淋巴结无肿大, 心肺未见异常, 腹软, 右下腹可触及一 4cm*3cm 大小肿块, 质中, 中度压痛, 肝脾肋下未触及, 移动性浊音(-)。化验: 血 Hb 135g/L, ESR 65mm/h。最可能的诊断是

- A 右侧结肠癌
- B 肠结核
- C 克罗恩病
- D 肠淋巴瘤

80.男性, 31 岁, 3 个月来低热, 右下腹痛, 加重半个月, 常有便秘, 有时腹泻伴糊样便。既往有肺结核病史。查体: T37.6℃, 浅表淋巴结无肿大, 心肺未见异常, 腹软, 右下腹可触及一 4cm*3cm 大小肿块, 质中, 中度压痛, 肝脾肋下未触及, 移动性浊音(-)。化验: 血 Hb 135g/L, ESR 65mm/h。为明确诊断, 最有意义的检查是

- A 便常规+隐血
- B 腹部 B 超
- C 结肠镜
- D X 线钡剂灌肠

81.男性, 31 岁, 3 个月来低热, 右下腹痛, 加重半个月, 常有便秘, 有时腹泻伴糊样便。既往有肺结核病史。查体: T37.6℃, 浅表淋巴结无肿大, 心肺未见

异常，腹软，右下腹可触及一 4cm*3cm 大小肿块，质中，中度压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音 (-)。化验：血 Hb 135g/L，ESR 65mm/h。首选的治疗是

- A 抗结核治疗
- B 手术治疗
- C 全身肿瘤联合化疗
- D 应用柳氮磺吡啶

82. 男性，22 岁。2 周前发热伴咽痛，2 天来双眼睑水肿和双下肢中度可凹陷性水肿。血压 150/95mmHg。化验尿蛋白 (++)，尿沉渣镜检 RBC30-50 个/HP，血肌酐 96 μ mol/L，血尿素氮 7mmol/L。下一步首选的辅助检查是

- A 心电图
- B 血常规
- C 尿本周蛋白
- D 尿相差显微镜检查

83. 男性，22 岁。2 周前发热伴咽痛，2 天来双眼睑水肿和双下肢中度可凹陷性水肿。血压 150/95mmHg。化验尿蛋白 (++)，尿沉渣镜检 RBC30-50 个/HP，血肌酐 96 μ mol/L，血尿素氮 7mmol/L。该患者肾脏病理检查最可能的病变类型是

- A 系膜毛细血管性肾小球肾炎
- B 系膜增生性肾小球肾炎
- C 毛细血管增生性肾小球肾炎
- D 新月体肾炎

84. 男性，22 岁。2 周前发热伴咽痛，2 天来双眼睑水肿和双下肢中度可凹陷性水肿。血压 150/95mmHg。化验尿蛋白 (++)，尿沉渣镜检 RBC30-50 个/HP，血肌酐 96 μ mol/L，血尿素氮 7mmol/L。该患者血压增高最可能的原因是

- A 原发性高血压
- B 水、钠潴留
- C 肾动脉狭窄
- D 血醛固酮增高

85. 男性，27 岁。一个月来头晕、乏力，加重 3 天，既往体健。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染，肺 (-)，心率 96 次/分，心律齐，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 1cm。血常规：Hb 75g/L，RBC $2.5 \times 10^{12}/L$ ，WBC $7.4 \times 10^9/L$ ，Plt $185 \times 10^9/L$ 。最可能的贫血诊断是

- A 缺铁性贫血
- B 巨幼细胞贫血
- C 再生障碍性贫血
- D 溶血性贫血

86. 男性，27 岁。一个月来头晕、乏力，加重 3 天，既往体健。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染，肺 (-)，心率 96 次/分，心律齐，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 1cm。血常规：Hb 75g/L，RBC $2.5 \times 10^{12}/L$ ，WBC $7.4 \times 10^9/L$ ，Plt $185 \times 10^9/L$ 。首选最有意义的检查是

- A 红细胞沉降率
- B 血白细胞分类
- C 血网织红细胞计数

D 粪常规+隐血试验

87.男性，27岁。一个月来头晕、乏力，加重3天，既往体健。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染，肺(-)，心率96次/分，心律齐，腹软，肝肋下未触及，脾肋下1cm。血常规：Hb75g/L，RBC $2.5 \times 10^{12}/L$ ，WBC $7.4 \times 10^9/L$ ，Plt $185 \times 10^9/L$ 。骨髓细胞学检查中，幼红细胞最可能出现的异常是

- A 巨幼样变
- B “核老浆幼”现象
- C 增生减低
- D 明显增生

88.女性，63岁。I型糖尿病25年，现用预混胰岛素每日2次注射治疗。2年前眼底检查发现网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急，抗生素治疗有效。近2个月咳嗽时常有尿液不自主流出。来院检查发现：BP160/100mmHg，尿糖(++)，尿酮体(-)，尿沉渣镜检白细胞5-10个/HP，空腹血糖9.6mmol/L，HbA1c8.6%，血Cr203 μ mol/L。B超检查提示膀胱残余尿量增加。该患者糖尿病微血管并发症的诊断是

- A 糖尿病视网膜改变III期，糖尿病自主神经病变
- B 糖尿病视网膜改变III期，糖尿病周围神经病变
- C 糖尿病视网膜改变IV期，糖尿病自主神经病变
- D 糖尿病视网膜改变IV期，糖尿病周围神经病变

89.女性，63岁。I型糖尿病25年，现用预混胰岛素每日2次注射治疗。2年前眼底检查发现网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急，抗生素治疗有效。近2个月咳嗽时常有尿液不自主流出。来院检查发现：BP160/100mmHg，尿糖(++)，尿酮体(-)，尿沉渣镜检白细胞5-10个/HP，空腹血糖9.6mmol/L，HbA1c8.6%，血Cr203 μ mol/L。B超检查提示膀胱残余尿量增加。该患者首选的降压药物是

- A 利尿剂
- B 钙通道阻滞剂
- C β 受体拮抗剂
- D 血管紧张素转换酶抑制剂

90.女性，63岁。I型糖尿病25年，现用预混胰岛素每日2次注射治疗。2年前眼底检查发现网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急，抗生素治疗有效。近2个月咳嗽时常有尿液不自主流出。来院检查发现：BP160/100mmHg，尿糖(++)，尿酮体(-)，尿沉渣镜检白细胞5-10个/HP，空腹血糖9.6mmol/L，HbA1c8.6%，血Cr203 μ mol/L。B超检查提示膀胱残余尿量增加。为改善血糖控制，最合适的治疗方案是

- A 在原胰岛素治疗方案基础上，加用二甲双胍0.5g，每日3次
- B 改用每日1次中长效基础胰岛素联合3次餐时胰岛素
- C 改用每日1次中长效基础胰岛素联合3种口服降糖药
- D 单用基础胰岛素

91. 男性，42岁，间断口腔溃疡5年，偶有阴囊溃疡，反复左侧眼炎三年，近一周自觉左眼视物不清。最可能的诊断是

- A 系统性红斑狼疮
- B 赖特（Reiter's）综合症
- C 克罗恩病
- D 贝赫切特（Behcet）病

92. 男性，42岁，间断口腔溃疡5年，偶有阴囊溃疡，反复左侧眼炎三年，近一周自觉左眼视物不清。该病较常见的其他临床表现是

- A 尿道烧灼感
- B 状形红斑
- C 结节性红斑
- D 心脏扩大

93. 男性，76岁，腹痛发热伴寒战10小时来诊，既往有心肌梗死，高血压病史。曾疑有胆总管结石。查体 T38.6℃，P100次/分，BP90/60mmHg。巩膜黄染，右上腹压痛，肠鸣音正常，化验，血常规：WBC：17.5*10⁹/L。最可能的诊断：

- A 急性胆囊炎
- B 急性胃肠炎
- C 急性胰腺炎
- D 急性胆管炎

94. 男性76岁，腹痛，发热，伴寒战10小时来诊，既往有心肌梗死，高血压病，曾疑有胆总管结石查体 T38.6度，p100次/分，bp90/60mmHg，巩膜黄染，右上腹压痛，肠鸣音正常，化验血 wbc17.5×10⁹/L 为明确诊断首选的检查是

- A ERCP
- B 腹部平片
- C MRCP
- D PTC

95. 男性76岁，腹痛，发热，伴寒战10小时来诊，既往有心肌梗死，高血压病，曾疑有胆总管结石查体 T38.6度，p100次/分，bp90/60mmHg，巩膜黄染，右上腹压痛，肠鸣音正常，化验血 wbc17.5×10⁹/L 最适合的诊疗措施是

- A 采用非手术治疗
- B 胆囊切除术
- C 经内镜鼻胆管引流术
- D 胆总管切开取石术

96. 男性，50岁，饮酒后上腹部疼痛伴恶心呕吐6小时就诊。既往体健。查体：T37℃，P80次/分，BP130/80mmHg。皮肤巩膜无黄染，上腹部压痛。无反跳痛，肌紧张。化验血：WBC11*10⁹/L，血淀粉酶1000u/L。最可能的诊断是：

- A 急性胆管炎
- B 急性胃炎
- C 急性胰腺炎

D 上消化道穿孔

97.男, 50 岁, 饮酒后上腹痛呕吐 6 小时就诊, 既往体健。T37P80 BP130/80, 皮肤巩膜无黄染, 上腹部压痛, 无反跳痛肌紧张。wbc $11 \times 10^9/L$ 血淀粉酶 1000 下列措施中不恰当的是

- A 禁食减压
- B 抗生素
- C 生长抑素
- D 吗啡止痛

98.男 64 岁 因胃癌行远端胃癌根治术, 毕 2 式吻合术, 术后一周出现上腹剧痛呕吐, 呕吐物不含有胆汁。查体上腹压痛无反跳痛肌紧张。化验血 wbc $12 \times 10^9/L$ 最可能的诊断

- A 倾倒综合症
- B 输入袢梗阻
- C 输出袢梗阻
- D 术后胃瘫

99.男, 64 岁因胃癌行远端胃癌根治术, 毕 2 式吻合术, 术后一周出现上腹剧痛呕吐, 呕吐物不含有胆汁。查体上腹压痛无反跳痛肌紧张。化验血 wbc $12 \times 10^9/L$ 目前不适合采取的治疗

- A 胃肠减压
- B 灌肠通便
- C 手术治疗
- D 温盐水洗胃

100. 女性, 24 岁, 间断上腹痛 3 个月。查体: 右上腹略饱满。化验: 肝功能正常。B 超: 胆总管扩张, 直径 5cm 左右, 肝内胆管无扩张。拟诊: 先天性胆管扩张症。为明确诊断下一步应该做的检查:

- A 超声内镜
- B ERCP
- C MRCP
- D PTC

101. 女, 24 岁, 间断性上腹痛 3 月就诊。查体右上腹饱满。化验: 肝功能正常。超声: 胆总管扩张, 直径约 5cm, 肝内胆管未见扩张。拟诊先天性胆管扩张症。进一步检查示单管全程囊状扩张。分型为

- A 型
- B II 型
- C III 型
- D IV 型

102. 女, 24 岁, 间断上腹痛 3 月。查体: 右上腹稍饱满。实验室检查: 肝功能正常。B 超: 胆总管扩张, 直径 5cm, 肝内胆管未见异常, 拟诊先天性胆管扩张症。最适合的手术方式是:

- A 囊肿-空肠吻合
- B 囊肿切除, 胆肠 R-en-Y 吻合术
- C 囊肿-十二指肠吻合
- D 囊肿切除, 肝管-十二指肠吻合术

103. 男性, 54 岁, 右肩颈痛 2 年伴右手麻木 3 个月, 颈部活动受限 1 周, 查体, c5-6 棘突间压痛, 右手掌桡侧皮肤感觉下降, Eaton (+), Spurling (+), x 片显示: 颈椎生理弧度消失, c5-6 椎体后缘骨质增生, 初步判断为颈椎病。下列选项中最有诊断价值的是

- A 颈肩部疼痛
- B 颈部活动受限
- C 右手麻木
- D Eaton (+)

104. 男性, 54 岁, 右颈肩痛 2 年半, 右手麻木 3 个月, 颈部活动受限 1 周, 查体 C5-6 棘突间压痛, 右手掌桡侧皮肤感觉减退, Eaton 试验 (+), Spurling (+), x 线显示生理弧度消失, C5-6 椎体后缘骨质增生, 初步判定颈椎病。以下需要鉴别的疾病是

- A 脊髓空洞症
- B 胸廓出口综合征
- C 肌肉萎缩侧索硬化症
- D 肩周炎

105. 男性, 54 岁, 右颈肩痛 2 年半, 右手麻木 3 个月, 颈部活动受限 1 周, 查体 C5-6 棘突间压痛, 右手掌桡侧皮肤感觉减退, Eaton 试验 (+), Spurling (+), X 线显示生理弧度消失, C5-6 椎体后缘骨质增生, 初步判定颈椎病。MRI 显示 C5~6 椎间盘突出, 压迫脊髓神经, 下列治疗措施不适宜的是:

- A 颈椎牵引
- B 颈椎按摩和推拿
- C 手术治疗
- D 应用非甾体类抗炎药

106. 男性, 28 岁。与他人掰手腕过程中, 右上臂突发疼痛、肿胀、畸形, 上肢不能活动。X 线片显示肱骨中下 1/3 骨折。若伴有神经损伤, 临床症状除骨折体征外, 还应有的体征是

- A 伸腕功能存在, 伸指功能丧失
- B 伸指、伸腕功能丧失
- C 屈指、屈腕功能丧失
- D 屈指、伸指功能丧失

107. 男性，28岁。与他人掰手腕过程中，右上臂突发疼痛、肿胀、畸形，上肢不能活动。X线片显示肱骨中下1/3骨折。若是有神经损伤应该如何治疗

- A 牵引固定
- B 手法复位
- C 切开复位，神经探查，小夹板固定
- D 切开复位，髓内钉固定

108. 医学专业是对公众所期待的责任有公开承诺的医学共同体，下列叙述不正确的是

- A 医学专业不需要通过系统的训练
- B 医学专业需要专业共同体自律
- C 医学专业通过强制实施行业标准获得社会信任
- D 医学专业通过严格的准入制度以保证专业诚信

109. 下列叙述中，不属于医患关系中患者义务的是

- A 患者负有保证就医诚实性的义务
- B 患者负有同意治疗后遵医嘱的义务
- C 传染病患者有防止疾病进一步播散的义务
- D 患者负有遵循即使是不必要的治疗的义务

110. 由于医患之间存在事实上的医学知识拥有的不平等，使患者出于脆弱并依赖医生的地位，相信医生在专业上是胜任的，将患者的健康利益置于首位，这样的医患关系是

- A 消费关系
- B 信托关系
- C 依附关系
- D 帮扶关系

111. 男性，35岁，因桡骨骨折行钢板内固定术，术后3个月钢板出现断裂，患者要求医院赔偿，院方不恰当的处理是

- A 倾听患者抱怨，进行解释安抚
- B 详细了解钢板断裂的相关情况
- C 明确责任，给出解决方案
- D 告知属于钢板质量问题，医院不负责处理

112. 为患者保密是重要的临床伦理原则，对患者医疗信息加以保护是医生的义务。下列医生的行为可以受到伦理学辩护的是

- A 应保险公司要求向其提供可识别患者的任何医疗信息
- B 应公司经理要求向其提供有关患者个人医疗过程的信息
- C 应媒体要求向其提供有关患者医疗费用支付的信息
- D 应同行要求，向其提供授权的匿名化医学研究信息

113. 关于获取手术知情同意的伦理要求，以下叙述不正确的是

- A 知情同意的伦理要求体现了尊重患者自主性原则

- B 知情同意仅是获得患者对治疗同意的签字文件
- C 知情同意书中应阐明手术预期受益与可能的风险
- D 知情同意应当是一个医患之间坦诚交流的过程

114. 根据临床试验的伦理学原则，以下叙述正确的是

- A 实验设计应使受试者和社会均受益
- B 试验设计应使受试者直接受益
- C 临床实验设计受益风险比应该合理
- D 受试者提出理由才允许其退出试验

115. 女性，23岁，妊娠7周到某诊所要求做人工流产手术，诊所王某为其做了手术，术中患者出现大出血后死亡，据查，王某属于非医师行医，根据《医师法》，应对其进行

- A 教育
- B 赔礼道歉
- C 警告
- D 依法追究刑事责任

116. 主要导致舒张压上升的因素是

- A 外周阻力增加
- B 心输出量增加
- C 主动脉和大动脉硬化
- D 循环血量增加

117. 导致脉压明显增大的原因是

- A 外周阻力增加
- B 心输出量增加
- C 主动脉和大动脉硬化
- D 循环血量增加

118. 能使血钙、血磷都升高的活性物质

- A 甲状旁腺素
- B 1,25-(OH)₂-D₃
- C 甲状腺素
- D 生长激素

119. 能使血钙升高、血磷降低的活性物质

- A 甲状旁腺素
- B 1,25-(OH)₂-D₃
- C 甲状腺素
- D 生长激素

120. 糖异生途径的重要中间产物是

- A 6-磷酸葡萄糖酸

- B 磷酸戊糖
- C 果糖-6 磷酸
- D 尿苷二磷酸葡萄糖

121. 糖原合成的重要中间产物

- A 6-磷酸葡萄糖酸
- B 磷酸戊糖
- C 果糖-6 磷酸
- D 尿苷二磷酸葡萄糖

122. 参加酮体分解的酶是

- A HMG-CoA 合酶
- B HMG-CoA 裂解酶
- C HMG-CoA 还原酶
- D 琥珀酰 CoA 转硫酶

123. 内源性胆固醇合成的关键酶是

- A HMG-CoA 合酶
- B HMG-CoA 裂解酶
- C HMG-CoA 还原酶
- D 琥珀酰 CoA 转硫酶

124. 可见于动脉粥样硬化的细胞是

- A Aschoff 细胞
- B 心衰细胞
- C 多核巨细胞
- D 泡沫细胞

125. 可见于手术缝线周围的的细胞是

- A aschoff 细胞
- B 心衰细胞
- C 多核巨细胞
- D 泡沫细胞

126. 与 brukitt 淋巴瘤相关的

- A HBV
- B CMV
- C HPV
- D EBV

127. 艾滋病患者容易感染的病毒是

- A HBV
- B CMV
- C HPV

D EBV

128. 上述疾病中，急性肺源性心脏病最常见的病因是

- A 慢性阻塞性肺疾病
- B 急性肺血栓栓塞症
- C 特发性肺纤维化
- D 重症肺炎

129. 上述疾病中，慢性肺源性心脏病最常见的病因是

- A 慢性阻塞性肺疾病
- B 急性肺血栓栓塞症
- C 特发性肺纤维化
- D 重症肺炎

130. 肝硬化导致性激素失调引起的临床表现是

- A 黄疸
- B 蜘蛛痣
- C 腹水
- D 牙龈增生

131. 门脉高压症的常见临床表现是

- A 黄疸
- B 蜘蛛痣
- C 腹水
- D 牙龈出血

132. 老年人结肠梗阻最常见的病因是：

- A 结肠癌
- B 肠套叠
- C 乙状结肠冗长
- D 粘连性肠梗阻

133. 儿童肠梗阻最常见的病因是

- A 结肠癌
- B 肠套叠
- C 乙状结肠冗长
- D 粘连性肠梗阻

134. 甲状腺术后，出现饮水呛咳的原因是

- A 损伤喉返神经
- B 损伤喉上神经内支
- C 损伤喉上神经外支

D 损伤颈交感干

135. 甲状腺术后，出现声音嘶哑的原因是

- A 损伤喉返神经
- B 损伤喉上神经内支
- C 损伤喉上神经外支
- D 损伤颈交感干

136. 影响静息电位的因素有

- A 细胞外液 K^+ 浓度
- B 细胞外液 Ca^{2+} 浓度
- C 膜对 K^+ 、 Na^+ 的相对通透性
- D 钠泵活动的水平

137. 属于生理性抗凝物质的有

- A 蛋白质 C
- B 组织因子途径抑制物
- C 纤溶酶原激活物抑制物-1
- D 肝素

138. 下列关于血红蛋白说法正确的有

- A R 型 Hb 对氧气的亲和力高于 T 型对氧气的亲和力
- B H^+ 浓度升高时不利于 Hb 与 O_2 的结合
- C Hb 与 O_2 结合后呈樱桃红色
- D Hb 中的 Fe 主要为三价铁离子

139. 大肠内细菌可产生的维生素有

- A 维生素 C
- B 维生素 B
- C 维生素 E
- D 维生素 K

140. 根据肾清除率原理，可测定的肾功能指标有

- A 肾小球滤过率
- B 肾血流量
- C 肾小管重吸收钠量
- D 肾小管泌氢能力

141. 库欣综合征患者循环血中血细胞计数的改变有

- A 红细胞增多
- B 淋巴细胞减少

- C 中性粒细胞减少
- D 嗜酸性粒细胞减少

142. 成熟红细胞体内代谢途径有

- A 糖酵解
- B 磷酸戊糖途径
- C 脂肪酸 β 氧化
- D 尿素生成

143. 参加肝生物转化相反应的酶有

- A 细胞色素 P450 单加氧酶
- B 醇脱氢酶
- C 单胺氧化酶
- D UDP-葡萄糖醛酸基转移酶

144. 原核生物基因表达调控的方式有

- A 阻遏蛋白封闭启动子的负调控
- B cAMP-CAP 介导的正调控
- C 转录衰减调控
- D RNA 编辑

145. 下列属于蛋白激酶偶联受体信号转导通路的有

- A MAPK 通路
- B JAK-STAT 通路
- C PI3K 通路
- D 经典的核受体通路

146. 下列原癌基因中，编码的蛋白质属于转录因子的是

- A MYC
- B FOS
- C EGFR
- D HER2

147. 重组 DNA 技术中常用的工具酶有

- A 限制性核酸内切酶
- B DNA 聚合酶
- C DNA 连接酶
- D 逆转录酶

148. 可见大量嗜酸性细胞浸润的病变有

- A 过敏性鼻炎
- B 血吸虫感染
- C 小叶性肺炎
- D 病毒性肝炎

149. 属于化脓性炎的病变有

- A 急性肾盂肾炎
- B 伤寒
- C 流行性脑脊髓膜炎
- D 亚急性甲状腺炎

150. 下列是肝细胞桥接坏死的是

- A 门管区-门管区肝连续的细胞坏死带
- B 中央静脉区-门管区肝连续的细胞坏死带
- C 大面积肝小叶坏死
- D 中央静脉区-中央静脉区肝连续的细胞坏死带

151. 肺心病可出现的病理变化有

- A 肺动脉圆锥显著膨隆
- B 左心室壁增厚
- C 右心室内乳头肌和肉柱显著增粗
- D 左心室扩张

152. 可引起心脏坏死的病变

- A 病毒性心肌炎
- B 主动脉粥样硬化
- C 肺动脉狭窄
- D 扩张性心肌病

153. 与大肠癌发生有关的疾病有

- A 幼年性息肉病
- B 溃疡性结肠炎
- C 家族性腺瘤性息肉病
- D 绒毛状腺瘤

154. 患者男，76岁慢性咳嗽、咳痰30余年，活动后气促5天，加重伴发热3天入院，入院后行抗感染对症治疗后有所好转，今晨突然感左胸疼痛，呼吸困难。体格检查提示左胸呼吸活动度减低。下列可以进行治疗有

- A 胸片和心电图检查
- B 吸氧
- C 镇静药物治疗
- D 无创呼吸机辅助治疗

155. 治疗急性左心衰（急性肺水肿）可选用的药物是

- A 毛花苷c
- B 伊伐布雷定
- C 奈西立肽
- D 左西孟旦

156. 可用 2%碳酸氢钠溶液反复洗胃的是

- A 对硫磷
- B 敌百虫
- C 敌敌畏
- D 乐果

157. 属于尿路刺激征的有

- A 尿潴留
- B 尿急
- C 尿痛
- D 排尿困难

158. 可引起 APTT 延长而 TT 正常的原因有 A V 因子缺乏

- B VII 因子缺乏
- C IX 因子缺乏
- D 纤维蛋白原减少

159. 关于糖尿病酮症酸中毒的治疗，正确的措施有

- A 前 4 小时输入 0.9%氯化钠 2000ml
- B 血糖降至 16.7mmol/L，补液需改为 5%葡萄糖氯化钠溶液
- C 首次胰岛素静注负荷量 10~20U，后静脉滴注每小时 0.1U/kg
- D 血 pH<7.1，HCO₃⁻<5mmol/L 时，需补碱治疗

160. 胆囊结石行胆囊切除术的适应症，正确的有

- A 结石直径≥3cm，无症状
- B 儿童胆囊结石，无症状
- C 伴有胆囊息肉样病变，直接大于 1cm
- D 瓷性胆囊

161. 急性阑尾炎体征

- A Rovig 征
- B cullen 征
- C Prsos 征
- D Obstrutor 征

162. 下列关于肠系膜上动脉栓塞的叙述，正确的有

- A 腹痛症状多较剧烈
- B 腹部体征早期较为轻微
- C 栓塞多发生在肠系膜上动脉根部
- D 选择性腹腔动脉造影有助于明确诊断

163. 下列关于肛裂的叙述，正确的有

- A 大多数位于肛管前正中线
- B 多见于青中年人
- C 常与前哨痔、肛乳头肥大同时存在
- D 常表现为便秘、腹胀

164. 关于骨巨细胞瘤的叙述，正确的是

- A 瘤组织以单核基质细胞和多核巨细胞为主要结构
- B 典型 x 线特征为骨端偏心性破坏，骨膜反应明显
- C 病变局部肿块压痛，关节活动不受限
- D 手术困难时，可放化疗，但是易复发

165. 下列不属于骨关节炎的关节畸形

- A 杵状指
- B 荷尔登畸形
- C 手指尺偏
- D 天鹅颈畸形

